

Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal

Volume 2019
Issue 1 2019
مؤتمر

Article 17

2019

التمثيل الخرائطي لبيانات مناخية منتخبة (عنصري (GIS) الحرارة والتساقط المطري) في محافظة نينوى بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية

م.م.وسام عبدالله حسين سلطان
جامعة الموصل / كلية التربية

م.م.بدر عبد الرحيم محمود اللهيبي
جامعة الحمدانية / كلية التربية

Follow this and additional works at: <https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad>

 Part of the [Arts and Humanities Commons](#), and the [Law Commons](#)

Recommended Citation

التمثيل الخرائطي لبيانات (GIS) (اللهيبي, م.م.بدر عبد الرحيم محمود 2019 and سلطان, م.م.وسام عبدالله حسين, "مناخية منتخبة (عنصري الحرارة والتساقط المطري) في محافظة نينوى بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية *Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal*: Vol. 2019: Iss. 1, Article 17.

Available at: <https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad/vol2019/iss1/17>

This Article is brought to you for free and open access by Arab Journals Platform. It has been accepted for inclusion in Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal by an authorized editor. The journal is hosted on [Digital Commons](#), an Elsevier platform. For more information, please contact rakan@aaru.edu.jo, marah@aaru.edu.jo, u.murad@aaru.edu.jo.



التمثيل الخرائطي لبيانات
مناخية منتخبة (عنصري الحرارة
والتساقط المطري) في محافظة
نينوى باستخدام نظم المعلومات
الجغرافية (GIS)

م.م. وسام عبدالله حسين سلطان

جامعة الموصل - كلية التربية

&

م.م. بدر عبد الرحيم محمود اللهيبي

جامعة الحمدانية - كلية التربية

مُسْتَخْلِص

يهدف البحث إلى دراسة مقارنة بين آليات إنتخاب الفئات لمعدلات العناصر المناخية بالطريقة التي تضمن أفضل إدراك بصري للخارطة بإستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية في إعداد الخرائط الموضوعية، ولما تحتل هذه الطرائق والتقنيات من مكانة بارزة في الساحة الجغرافية في الوقت الحاضر مستعينين بذلك بمتغير بصري لغرض تمثيل الظاهرة المقصودة في البحث.

تنجس أهمية هذا البحث من خلال ما يتطرق إليه من دراسة طرائق التمثيل الكارتوكرافية التقليدية وبرامج نظم المعلومات الجغرافية التي شاع إستعمالها في الآونة الأخيرة. إذ لا يخفى لما لطرائق التمثيل الكارتوكافي وتقنيات نظم المعلومات الجغرافية من أهمية كبيرة في الدراسات الخرائطية في كونها تمثل خير دليل للباحث عند دراسة أي ظاهرة جغرافية، ومن ثم التوصل إلى مجموعة من الإستنتاجات وبعض المقترنات التي تساهم في حل مشاكل التمثيل الكراتونغرافية.

المقدمة

تمثل الخرائط عدة الجغرافي والأدلة التي يحتاجها في دراساته سواء كانت طبيعية أو بشرية إذ أنه لا يستطيع إنجاز دراسته دون الإعتماد عليها حيث تفتح أمامه نافذة يرى من خلالها الكرة الأرضية كلّها أو جزءاً صغيراً منها، فالخرائط جميعها تمتلك خاصية مشتركة بأنها تمثل مصغر للحقيقة سواء كانت هذه الحقيقة قابلة للرؤية أو اللمس أو الإحساس بها.

يستخدم الجغرافي الخريطة عادة لغرضين أساسين الأول وسيلة للتعبير عن الحقائق الكثيرة التي يود أن يزيدها إيضاحاً وذلك كونها أفضل بكثير من الوصف لتوضيح الحقائق الموجودة في ذهن الجغرافي، أما الغرض الثاني فيكمن في كون الخريطة أدلة يمكن من خلالها عرض المعلومات والبيانات الإحصائية، وبذلك يكون الجغرافي قد يستند إلى علم آخر ليتمكن من الوصول إلى الغرض الثاني من الخريطة ألا وهو علم (الكارتوغرافيا).

إن المفاهيم الخرائطية التقليدية المستخدمة في رصد المعلومة وبنائها هي الأساس التي لا يمكن إغفاله عند بناء الخرائط على نظم المعلومات الجغرافية، وإن استخدام نظم المعلومات الجغرافية لا يلغى القواعد التقليدية التي يتم بواسطتها تمثيل ما على سطح الأرض من ظواهر طبيعية أو بشرية ورؤيتها على الخرائط، ولكنه يساعد على تحويلها إلى هيئة رقمية يسهل التعامل معها وإدارتها وقياسها وتحليلها مع سهولة الحذف والإضافة والتخزين والتحديث وإمكانية عرضها من زوايا متعددة خلال وقت قصير.

وقد جاءت هذه الدراسة المحدودة بمثابة إبراز تقنيات نظم المعلومات الجغرافية في التمثيل الخرائطي، إذ أن عملية تمثيل الخرائط نفسها سواء كانت بالطرق التقليدية أو بواسطة نظم المعلومات الجغرافية واحدة على الرغم من الاختلاف بين الطريقتين فال الأولى يدوية والثانية آلية، كما اعتمدت الجانب الطبيعي (بيانات المناخ) موضوعاً في تطبيق تلك الطرق لرسم الخرائط.

**مشكلة البحث:**

تتلخص مشكلة الدراسة في مدى فعالية تطبيق نظام المعلومات الجغرافية في تمثيل الطواهر الجغرافية عامة والطبيعية خاصة، وهل توفر لنا التقنيات الحديثة الإمكانية في تحديد الآلية المثلث لانتخاب عدد الفئات المناسبة للتمثيل الخرائطي للعناصر المناخية؟

هدف البحث:

إن موضوع البحث يهدف إلى دراسة مقارنة بين آليات إنتخاب الفئات لمعدلات العناصر المناخية بالطريقة التي تضمن أفضل إدراك بصري للخارطة بإستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية في إعداد الخرائط الموضوعية، ولما تحتل هذه الطرق والتقنيات من مكانة بارزة في الساحة الجغرافية في الوقت الحاضر مستعينين بذلك بمتغير بصري لغرض تمثيل الظاهرة المقصودة في البحث.

فرضية البحث:

هل إن إعداد وتمثيل خرائط التوزيعات والمعدلات لعناصر مناخية معينة بوساطة تقنيات نظم المعلومات الجغرافية هي أفضل وسيلة في إعداد الخرائط الموضوعية (خرائط الجانب الطبيعي) من جانب السرعة والتكلفة والتحديث والخزن؟

أهمية البحث:


تبعد أهمية هذا البحث من خلال ما يتطرق إليه من دراسة طرائق التمثيل الكارتوكرافية التقليدية وبرامج نظم المعلومات الجغرافية التي شاع إستعمالها في الآونة الأخيرة. إذ لا يخفى لما لطرائق التمثيل الكارتوكافي وتقنيات نظم المعلومات الجغرافية من أهمية كبيرة في الدراسات الخرائطية في كونها تمثل خير دليل للباحث عند دراسة أي ظاهرة جغرافية.

- ١- تحديد منطقة الدراسة :

تعد محافظة نينوى الإطار الجغرافي المكاني لمنطقة الدراسة لإعتبارات بيئية لما فيها من أنماط مناخية فضلاً عن إعتبارات جغرافية مكانية لما تشغله من مساحة ومحطات مناخية تعين في إستغلال معطياتها المناخية في تحديد مشكلة البحث والوصول إلى هدفه، فضلاً عن المحطات المناخية المجاورة زاخو، اربيل، بيجي، عنه. زمانياً تمثلت بالبيانات المناخية لعناصر المناخ المسجلة او المقدرة وخاصة عناصر الاشعاع الشمسي والمتغيرات

عدد خاص بالمؤتمرات ٢٠١٩-٢٠٢٠

المفقودة وعوامل اخرى للمدة من (١٩٨٠ - ٢٠٠٢)، الخارطة (١) توضح منطقة الدراسة طبيعياً، وفيما يلي توضيح تأثير الموقعين الفلكي والجغرافي على العناصر المناخية:-
الخارطة (١) نموذج الإرتفاع الرقمي DEM والموقع الفلكي لمنطقة الدراسة ومواقع المحطات المناخية (*)



(*) المصدر: من عمل الباحثان بالاعتماد على برنامج Arc Gis 10.2

١-١ : الموقع الجغرافي :

تشغل محافظة نينوى مساحة واسعة تبلغ (٣٧٣٢٣) كم^٢ من مجموع مساحة العراق البالغة (٤٣٥٥٢) كم^٢ وهي تشكل ما نسبته (٦,٨%) من مساحة القطر^(١)، وهذا الاتساع ادى بدوره الى تباين الظروف الطبيعية وبخاصة المناخ.

لذا تمثل محافظة نينوى الجزء الشمالي والشمالي الغربي من العراق وهي تمثل منطقة السهول المموجة المحصورة بين الاقليم الجبلي في الشمال والشمال الشرقي، وهضبة الجزيرة من الغرب والجنوب الغربي، مما جعلها نقطة ارتکاز اساسية للمنطقة



الجلبية، وببوابة مفتوحة بإتجاه أرض الجزيرة وعالم البحر المتوسط، الامر الذي جعلها تتمتع بموقع جغرافي مهم رسمته ظروف البيئة الطبيعية بما تحتويه من مجموعة من الهضاب كهضبة أرض الجزيرة وهضبة الموصل ومجموعة من المرتفعات والتلال الفاصلة بين مظاهر السطح الرئيسية، ومجموعة من السهول المحصورة بين المرتفعات، والسهول المنبسطة على الهضبة والسهول الفيضية والمرورية، فضلاً عن إحاطتها بعدد من المسطحات المائية المتباينة البعد والتأثير على مناخ المنطقة، وإحتواها على الكثير من الموارد السطحية والجوفية.

يحدّها من الشمال محافظة دهوك ومن الجنوب محافظة الانبار ومن الجنوب والجنوب الشرقي محافظة صلاح الدين ومن الشرق محافظة اربيل وكركوك ومن الغرب الجمهورية العربية السورية.

٢-١: الموقع الفلكي :

تقع محافظة نينوى بين دائرتى عرض $37^{\circ}34' - 37^{\circ}53'$ شمالاً وخطي طول $41^{\circ}25' - 44^{\circ}25'$ شرقاً^(١) الخارطة (١)، وهي بموقعها هذا تتوسط المنطقة المعتمدة الشمالية، وعلى الرغم من الموقع بالنسبة لخطوط الطول فإنه لا يترك دلالة جغرافية على الموقع الا في أهميته في تحديد الوقت المحلي، غير أن الموقع بالنسبة لدائرة العرض يحدد شدة الاشعاع الشمسي ومقدار كميته اللذين يعتمدان على عاملين أساسيين هما زاوية سقوط الاشعة وساعات السطوع الشمسي^(٣)، وبما أن الشمس تعد الضابط الاساسي لعناصر المناخ فهي المنبع الرئيس لحرارة الجو على سطح الارض، وبما أن صفاء الجو وزاوية سقوط الاشعة والاختلاف في مقدار بعد الارض عن الشمس وإختلاف سرعة دوران الارض حول الشمس وحركتها الظاهرة بين المدارين وميلان محور الارض وطول النهار وعوامل أخرى كلها تساهم في إختلاف شدة الاشعاع وكميته^(٤)، وعلى هذا الاساس تعدد دوائر العرض من الضوابط التي تتحكم في توزيع الخصائص المناخية على وجه الارض^(٥).

وبما أن العراق يقع في القسم الجنوبي من المنطقة المعتمدة الشمالية في منطقة إنتقال ما بين المناخ الصحراوي الجاف ومناخ البحر المتوسط، فقد أكسبه هذا الموقع صفات وخصائص إشعاعية شبيه بالمناخ المداري، إذ ترتفع قيم معدلات الاشعاع الكلي^(٦).



٢ - المحطات المناخية:

توجد في محافظة نينوى (٨) محطات مناخية هي ربيعة، تلعفر، سنجار، الموصل، البعاج، تل عبطة، شيخان وعقرة، إلا أن توزيع هذه المحطات غير متكافئ فهي لا تغطي مساحة منطقة الدراسة بشكل مثالي، لكن تتركز معظم هذه المحطات في الجانب الشمالي والشمالي الغربي للمحافظة إضافة إلى تقاربها، وإفتقار الجانب الشرقي من أي محطة مناخية، إضافة إلى القسم الجنوبي. انظر الجدول (١) يمثل بيانات معدلات الحرارة الشهيرية مع احداثيات الموقع لكل محطة مناخية:

الجدول (٢) بيانات معدلات الحرارة الشهرية للفترة ١٩٨٠-٢٠٠٢م مع احداثيات الموقع

المحطات المناخية

المطبات / الشهر	كانون الثاني	شباط	آذار	نيسان	أيار	حزيران	تموز	آب	أيلول	تشرين أول	تشرين ثالثي	كانون الأول	المعدل السنوي	ID	X	Y
الموصل	6.6	8.5	12.4	18	24.6	30.9	34.4	33.3	28.5	21.1	13.3	8	19.96666667	7	36.32	43.14
ریوة	5.4	7	10.6	16.3	22.4	28.5	32.1	31.2	26.3	19.7	12.2	7.2	18.24166667	8	36.79	42.09
سنجر	6.4	8.3	12.2	18.1	24.7	30.5	34.3	33.7	29.7	32	14.5	8.7	21.09166667	9	36.3	41.86
تلغفر	7.4	10.1	15.2	19.8	27.2	33.8	34.7	37.1	30.4	24.0	13.4	8.5	21.80125	10	36.35	42.44
البعاج	6.5	10.4	13.1	18.5	26.0	31.8	33.2	32.2	26.7	23.5	13.5	10.6	20.5	11	36.02	41.72
تل عبطة	7.1	9.1	13.2	19.6	24.2	26.5	29.3	34.1	29.3	22.7	14.2	8.2	19.79166667	12	35.93	42.55
الشيدان	5.1	7.9	11.3	16.8	23.4	30.7	31.9	31.1	27.4	22.5	13.2	8.7	18.6	14	36.66	43.34
عفرا	4.2	6.4	9.1	14.2	21.3	27.8	30.8	29.6	25.5	19.2	11.1	6.2	17.6	13	36.74	43.84

المصدر: من عمل الباحثان بالإعتماد على بيانات وزارة النقل والمواصلات، الهيئة العامة للأنهاء الحوية العراقية، بيانات غير منشورة.

أما الجدول (٢) فيظهر لنا بيانات التساقط المطري في جميع محطات المنطقة
واعتماد على بيانات هذا الجدول في، التمثيل الخرائطي، لبيانات



الجدول (٢) معدلات التساقط المطري لمحطات منطقة الدراسة للفترة ١٩٨٠-٢٠٠٢م (*)

الشهر	الموصل	ربيعية	تعزف	سنمار	تل عبطة	البعاج	شیخان	عقرة
كانون الثاني	61.0	55.8	58.9	65.0	42.6	44.4	69.2	٧٢,١
شباط	61.3	53.6	49.8	62.9	35.0	37.2	٧٢,٣	٧٤,٦
اذار	62.1	58.2	58.5	62.9	34.3	35.8	٦٨,٥	٧٠,٢
نيسان	40.0	37.8	30.4	26.9	29.4	13.9	٥٥,٢	٦٣,٨
مايس	15.5	23.2	14.7	18.5	8.0	15.3	٢٨,٧	٤٠,٤
حزيران	1.9	1.5	0.8	1.3	0.2	0.9	٧,١	٩,٣
تموز	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	١,٣	٢,٢
آب	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	٠,٧	٠,٨
أيلول	0.4	0.7	1.0	0.5	0.5	0.4	٠,٩	٢,٦
تشرين الأول	14.1	23.3	14.6	16.2	11.9	11.6	١٩,٨	٢٢,٩
تشرين الثاني	50.6	34.7	38.9	39.0	17.7	24.0	٣٧,٤	٤٤,٦
كانون الأول	61.2	57.9	52.8	40.9	40.9	39.0	٥٤,٦	٥٩,٧
المجموع السنوي	368.3	346.9	320.5	220.7	222.6	٤٥٤,٥	٤٥٤,٥	٤٦٣,٨
المعدل الشهري	30.667	28.833	26.733	29.67	18.167	18.55	٣٧,٨	٣٨,٦

المصدر: من عمل الباحثان بالاعتماد على بيانات وزارة النقل والمواصلات، الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية، بيانات غير منشورة، ١٩٨٠-٢٠٠٢م.


-٣- آلية إنتخاب الفئات اللونية في برامجيات نظم المعلومات الجغرافية للت berhasil الخرائطي

تعد الخرائط مصدرًا أساسياً في توفير العرض المرئي للظواهر الجغرافية، وخاصة فيما يخص خرائط العناصر المناخية التي يتم تمثيلها بالطراائق الكارتوكرافية التقليدية أو بوساطة نظم المعلومات الجغرافية. فـإمكانية إنتخاب الفئات اللونية للت berhasil خرائط المناخ تتم من خلال استخدام خارطة محافظة نينوى (كنموذج تطبيقي) كخارطة أساس بمقاييس رسم (١ / ١٢٠٠٠٠)، وبعد تحديد خارطة الأساس المصححة لعرض الت berhasil اللوني تم الت berhasil للمعدل السنوي

لبيانات المناخ (الحرارة ، التساقط المطري) بإستخدام تدرجات من أقل فئة من الجنوب الغربي الى أكبر فئة في أقصى الشمال الشرقي ومن خلال إستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية ArcGIS 10.2 كبرنامج أساس في عملية التمثيل والرسم الخرائطي لموضوع البحث فقد تم إتباع الخطوات التالية في التمثيل الكارتوغرافي للخروج بخرائط تعبّر عن شكل التساقط المطري في منطقة الدراسة سنويًا (كمودج) للخروج بخرائط تعبّر عن شكل معدلات الحرارة السنوية و التساقط المطري في محافظة نينوى سنويًا وكما يلى:

- ١- يتم عمل خارطة أساس لمحافظة نينوى من خلال رسمنها أو إدراج ملف رسم جاهز لمنطقة الدراسة وإدراج البيانات الخاصة بها. أنظر للشكل (١):

شكل (١) رسم المحطات المناخية^(*)




(*) المصدر : من عمل الباحثان بالإعتماد على، برنامج ArcGis 10.2

- ٢- بعدها ندخل البيانات الخاصة بالتساقط المطري أو معدلات درجات الحرارة في جدول البيانات الخاص بمحطات منطقة الدراسة في مختلف أجزاء نينوى، أنظر الشكل (٢) التالي.



الشكل (٢) إدخال البيانات الخاصة بالمحطات المناخية^(*).




(*) المصدر: من عمل الباحثان بالاعتماد على برنامج ArcGIS 10.2

٣- ومن خلال الأداة الخاصة بعملية التحليل الإحصائي الأرضي Radial Basis Function نجري عملية Interpolation بإستخدام طريقة Analyst Geostatistical

وعلى أساس حقل قيم معدلات الأمطار وكما موضح في الشكل (٣).

الشكل (٣) تحديد نطاقات تساقط المطر^(*).




(*) المصدر: بالإعتماد على برمجيات نظم المعلومات الجغرافية ArcGIS 10.2

٤- بعد ذلك ننقر على تفعيل التطبيق لإنشاء حدود لخطوط تساقط الأمطار وفقاً للقيم المحددة لكل محطة في منطقة الدراسة، ويكون الناتج النهائي خارطة محافظة نينوى لمعدلات التساقط المطري وكما موضح أدناه في الشكل (٤) والخارطة (٢).

(٤) التمثيل الخرائطي لمعدلات التساقط المطري في محافظة نينوى وال العراق للفترة


(*) م ۲۰۰۲-۱۹۸۷



(*) المصدر : بالاعتماد على، برمجيات نظم المعلومات الجغرافية ArcGIS 10.2

٥- بعد تشكيل الخارطة تقوم بعملية تحديد أفضل حزمة لونية تستخدم في تمثيل التساقط المطرى مع عدد فئات مثالية للخروج بخراطط دقيقة وذات أدراك بصري وفني مقبول وكما في الخطوات التالية:


الخارطة (٢) معدلات التساقط المطري في محافظة نينوى للفترة ١٩٨٠-٢٠٠٢م



المصدر: من عمل الباحثان بالاعتماد على برنامج Arc Gis 10.2 وبيانات الجدول (١).


كليك يمين على الملف (ملف المحطات المناخية لمنطقة الدراسة) من خلال جدول **layer—properties** ، ومن ثم نختار التاب **symbology** الترميز، أنظر للأشكال (٥) و (٦).

الشكل (٥) عملية تحديد الحزمة اللونية للتمثيل الخرائطي (*)




(*) المصدر: بالاعتماد على برمجيات نظم المعلومات الجغرافية ArcGIS 10.2

الشكل (٦) الحزم اللونية المستخدمة في التمثيل الخرائطي (*)



(*) المصدر: بالاعتماد على برمجيات نظم المعلومات الجغرافية ArcGIS 10.2


ومن خلال التحكم في طبيعة الحزم الموجودة وإنخاب عدد الفئات الأمثل للخروج بخارطة لمعدل التساقط المطري في برنامج Arc Map 10.2، تكون قد أجزنا أهم مخرجات البحث الخرائطية الخاصة بالتساقط المطري في منطقة الدراسة بإستخدام حزمتين لونيتيں للتمثيل لغرض إبراز التباين وزيادة الإدراك البصري للخارطة والتي تعتبر الأفضل في تمثيل التساقط المطري، وكما في الخارطة (٣).



(*)المصدر: من عمل الطلبة بالاعتماد على برنامج Arc Gis 10.2

أما فيما يخص التمثيل الكارتوجرافي لمعدلات درجات الحرارة السنوية لمنطقة Radial Basis الدراسة فإمكان تطبيق نفس الخطوات السابقة وأيضاً بإستخدام طريقة Function مع تغيير اختيار (حقل القيم) إلى معدلات درجات الحرارة السنوية، فيكون الإخراج النهائي الخارطة (٤) التالية.

الخارطة (٤) المعدلات السنوية لدرجات الحرارة في محافظة نينوى للفترة ١٩٨٠-٢٠٠٢م



المصدر: من عمل الطلبة بالاعتماد على برنامج Arc Gis 10.2

الاستنتاجات والمقترحات

توصلت الدراسة بعد تحليل البيانات وتمثيلها على الخرائط إلى مجموعة من الاستنتاجات تمثلت فيما يلى:-

- ١- إن الإعتماد على الأساليب التقليدية في تمثيل المتغيرات تنتج لنا خرائط تفتقر للكثير من المزايا، في حين أن الدقة وإخراج الكارتوكراطي العلمي هي سمة من سمات الخرائط الحديثة.

٢- تتميز برامجات نظم المعلومات الجغرافية للأدوات المناسبة للتمثيل (و خاصةً التمثيل اللوني) من ناحية النسب اللونية وقيمها بشكل دقيق على عكس ما موجود في البرامج التجارية غير الأكademية مثل الفوتوشوب والكوريل درو وغيرها.

٣- عند تقارب القيم الرياضية للفئات الممثلة في الخارطة تكون سبب في إزدياد نسب التداخل وقلة مستوى الإدراك البصري وهذا ما واجهه الباحثان في تمثيل خارطة محافظة نينوى لونياً بالذات.

٤- دور الإنطباع لمصمم الخارطة له الأثر الكبير في آلية التمثيل وهي من العقبات التي تسجل مع غيرها من عقبات التمثيل الخرائطي، كون عدم وجود حزم لونية متقدمة عليها دولياً في عملية التمثيل اللوني وذلك لصعوبة تحديد عدد الفئات المناسبة لكل متغير من المتغيرات المحيطة بنا.

المقترنات

- ١- تطوير العمل بإستخدام برمجيات نظم المعلومات الجغرافية في توضيح العلاقات المختلفة بين متغيرات الظواهر الجغرافية المختلفة لإتخاذ الحلول المناسبة والمثلثى حل المشكلات الجغرافية المبحوثة وفقاً مع ما يتلاءم مع طبيعتها.
 - ٢- الأخذ بنظر الإعتبار بما يتم التوصل إليه من تلك الدراسات في الواقع العملي كل وفق طبيعة عمله.
 - ٣- التشجيع على دراسات الخرائط التطبيقية وبالمواضيع الجغرافية كافة والأصغر الوحدات الإدارية إن أمكن ذلك.



- ٤- عند تمثيل أي خريطة فإن من الضروري مراعاة ثلاثة جوانب طريقة التمثيل والهدف من الخريطة وطبيعة البيانات وبذلك يوصي الباحثان بما يأتي:-
- أ- استخدام طريقة التضليل المساحي في تمثيل التوزيع الفعلي وخصوصاً مع التوزيعات التي تتتوفر عنها إحصاءات، إذ يكون الهدف منها إظهار صفة التوزيع المكاني أكثر أهمية من معرفة الكم.
 - ب- استخدام إسلوب النقاط الكمية في تمثيل توزيع الظاهرة وخصوصاً مع التوزيعات المكانية.
 - ت- استخدام إسلوب موضع المساحة النسبية وإسلوب الخطوط النسبية وإسلوب الأعمدة المكعبة والإسطوانات النسبية عند تمثيل البيانات لمعرفة التوزيع بالأرقام المطلقة إذ يكون الهدف منها إظهار الكم الممثل بها.
 - ث- استخدام إسلوب الكرات والمكعبات النسبية مع الاحصاءات المتباينة في قيمها بشكل كبير إذ أن الهدف منها إظهار صفة التبادل المكاني.

هواش البحث ومصادره:

- (١) الجهاز المركزي للأحصاء، هيئة التخطيط، المجموعة الاحصائية السنوية، ١٩٩٧، ص ٨-٩.
- (٢) جمهورية العراق، وزارة النقل والمواصلات، الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية، بيانات غير منشورة
- (٣) علي حسين الشلش، جغرافية الأقاليم المناخية، مطبعة بغداد، ١٩٧٨، ص ٢٣
- (٤) ابراهيم شريف، جغرافية الطقس، الكتاب الاول، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد، ١٩٩١، ص ٦١.
- (٥) احمد علي اسماعيل، الجغرافيا العامة، موضوعات مختارة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الفحالة، ١٩٩٦، ص ٢٨.
- (٦) فاضل باقر الحسني، الخواص الاشعاعية لمناخ العراق، مجلة الاستاذ، العدد (١)، ١٩٧٨، ص ٤١٢.